

Всероссийская олимпиада школьников. Муниципальный этап 2024/25 уч.г.  
Математика, 8 класс, решения

Время выполнения 235 мин. Максимальное кол-во баллов – 35

Все задания по 7 баллов

Критерии оценивания заданий

Баллы	Правильность (ошибочность) решения
7	Полное (верное) решение.
6-7	Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие на решение.
5-6	Решение в целом верное. Однако не рассмотрены отдельные случаи, либо решение содержит ряд ошибок, но может стать правильным после небольших исправлений или дополнений.
4	Верно рассмотрен один из двух (более сложный) существенных случаев, или в задаче типа «оценка+пример» верно получена оценка.
2-3	Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении задачи, или в задаче типа «оценка+пример» верно построен пример.
1	Рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии решения (или при ошибочном решении).
0	Решение неверное, продвижения отсутствуют.
0	Решение отсутствует.

*\*Указания к оцениванию задач содержатся также в комментариях к решениям*

8.1. Лиза купила новый шампунь. Флакон старого шампуня стоил 200 рублей, а новый стоит на 20% дороже. Но зато флакона хватает на срок в полтора раза дольше. Сколько денег сэкономит Лиза к моменту, когда полностью использует два флакона нового шампуня?

**Ответ.** 120 рублей.

**Решение.** Два флакона нового шампуня стоят 480 рублей. Их хватает на тот же срок, что и трёх флаконов старого шампуня, за которые Лиза заплатила бы 600 рублей. Сэкономлено 120 рублей.

**Комментарий.** Любое полное решение задачи – 7 баллов. За арифметическую ошибку снимается 3 балла. Приведён только ответ – 0 баллов. Задача не решена или решена неверно – 0 баллов.

8.2. Из квадрата, сторона которого является целым числом, вырезали несколько непересекающихся квадратиков размером  $1 \times 1$ . Оказалось, что из вырезанных квадратиков можно составить квадрат. Площадь оставшейся части большого квадрата равна 119. Чему может равняться сторона квадрата, составленного из вырезанных квадратиков?

**Ответ.** 5 или 59.

**Решение.** Обозначим стороны квадратов  $a$  и  $b$ . Тогда  $a^2 - b^2 = 119$ ,  $(a - b)(a + b) = 119$ . Число 119 раскладывается в произведение множителей двумя способами:  $119 = 1 \cdot 119$ ,  $119 = 7 \cdot 17$ . Получаем две системы  $\begin{cases} a - b = 1, \\ a + b = 119 \end{cases}$  и  $\begin{cases} a - b = 7, \\ a + b = 17. \end{cases}$  В первом случае  $a = 60$ ,  $b = 59$ . Во втором случае  $a = 12$ ,  $b = 5$ .

**Комментарий.** Верное обоснованное решение – 7 баллов. Следующие критерии суммируются. Составлено уравнение  $a^2 - b^2 = 119$  – 1 балл; приведено к виду  $(a - b)(a + b) = 119$  – 1 балл; число 119 разложено на множители – 1 балл; получены две системы – 2 балла, системы верно решены – 2 балла. Если оба ответа найдены подбором, и не доказано, что других ответов нет – 2 балла. Если подбором найден только один ответ – 1 балл.

8.3. Число 3576 представлено в виде суммы двух положительных целых слагаемых, которые можно сложить без переноса цифр в следующий разряд. Каким числом способов это можно сделать? Пары слагаемых  $(a, b)$  и  $(b, a)$  при  $a \neq b$  считаются отдельно.

**Ответ.** 1344.

**Решение.** Число, соответствующее каждой цифре, должно раскладываться в сумму двух слагаемых. Число 3 можно разложить 4 способами  $(0 + 3, 1 + 2, 2 + 1, 3 + 0)$ . Число 5 – 6 способами, число 7 – 8 способами, число 6 – 7 способами. Всего способов  $4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 7 = 1344$ .

**Комментарий.** Полное обоснованное решение – 7 баллов. Верная идея решения, но допущены ошибки при подсчётах числа способов – снимается 1 балл за одну ошибку, 3 балла за две ошибки, 5 баллов за большее число ошибок. Решение начато, есть некоторое продвижение – 1-2 балла. Приведён только ответ – 0 баллов.

8.4. В треугольнике  $ABC$  угол  $BAC = 45^\circ$ , сторона  $AB = 12$ . На стороне  $AB$  взята точка  $D$  так, что  $AD = 4$ ,  $\angle BDC = 60^\circ$ . Найдите  $\angle CBD$ .

**Ответ.**  $75^\circ$ .

**Решение.** Опустим из точки  $B$  перпендикуляр  $BK$  на отрезок  $CD$ , и проведём отрезок  $AK$ . Угол  $DBK = 30^\circ$ , поэтому катет  $KD = \frac{BD}{2} = 4$ , откуда треугольник  $AKD$  – равнобедренный,  $AD = DK$ . Поскольку  $\angle ADK = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$ ,  $\angle AKD = \angle KAD = 30^\circ$ . Тогда  $\angle KAC = 45^\circ - 30^\circ = 15^\circ$  и  $\angle AKC = 180^\circ - 30^\circ = 150^\circ$ ,  $\angle ACK = 180^\circ - 150^\circ - 15^\circ = 15^\circ$ . Поэтому треугольник  $AKC$  – равнобедренный,  $AK = CK$ . Но и треугольник  $AKB$  – равнобедренный, так как углы при основании  $AB$  равны  $30^\circ$ . Следовательно,  $AK = KB$ , и поэтому  $KB = CK$ . Треугольник  $CBK$  равнобедренный и прямоугольный, отсюда  $\angle CBK = 45^\circ$ , а  $\angle CBD = 45^\circ + 30^\circ = 75^\circ$ .

**Комментарий.** Любое полное решение задачи – 7 баллов. Приведено верное в целом рассуждение, содержащее незначительные пробелы или неточности – до 6 баллов. Если решение не доведено до конца, за доказательство полезных вспомогательных утверждений – 1-2 балла.

8.5. На каждой стороне каждой из 6 карточек записано по одному числу. Петя выкладывает все карточки в ряд (любой стороной вверх), потом складывает числа, которые он видит на первых трёх карточках слева, и вычитает из них сумму чисел, которые он видит на оставшихся трёх карточках справа.

а) Какое наименьшее число он может получить, если пары чисел на карточках таковы:  $(18; 17)$ ,  $(4; 12)$ ,  $(8; 11)$ ,  $(1; 17)$ ,  $(19; 5)$ ,  $(7; 14)$ ?

б) Укажите и обоснуйте алгоритм, позволяющий решить такую задачу для любых чисел на  $2n$  карточках.

**Ответ.** а)  $-38$ ; б)  $a_1 + a_2 + \dots + a_n - b_{n+1} - b_{n+2} - \dots - b_{2n}$ , где карточки  $(a_i; b_i)$  упорядочены по неубыванию среднего арифметического  $a_i, b_i$  и  $a_i \leq b_i$ .

**Решение.** б) Запишем числа  $(a, b)$  на карточках в порядке возрастания  $(a \leq b)$ . Легко видеть, что для сложения надо использовать меньшие числа  $(a)$ , для вычитания – большие числа  $(b)$ . Упорядочим карточки по возрастанию (неубыванию) среднего арифметического  $\frac{a+b}{2}$ . Ответом будет являться число

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n - b_{n+1} - b_{n+2} - \dots - b_{2n}.$$

Обоснование. При замене любого из чисел  $a_i$  ( $i \leq n$ ) на  $a_k$  ( $k > n$ ) сумма изменится на

$$a_k - a_i + b_k - b_i = (a_k + b_k) - (a_i + b_i) \geq 0.$$

а) Следуя алгоритму, получаем

$(a; b)$	$(4; 12)$	$(1; 17)$	$(8; 11)$	$(7; 14)$	$(5; 19)$	$(17; 18)$
$\frac{a+b}{2}$	8	9	9,5	10,5	12	17,5

$$4 + 1 + 8 - 14 - 19 - 18 = -38.$$

**Комментарий.** Полное обоснованное решение – 7 баллов. а) Найден верный ответ – 1 балл, ответ обоснован – 1 балл. б) Указан верный алгоритм – 3 балла, алгоритм обоснован – 2 балла; баллы суммируются. Если обоснование ответа в пункте а) допускает обобщение (но оно не сделано), то баллы за эту часть повышаются на 1 балл.